

## FICHA TÉCNICA

<i>PRODUCTO:</i>	RATSUL B CEBO FRESCO RATICIDA
<i>COMPOSICIÓN:</i>	Sustancia activa: <b>BROMADIOLONA</b> (3-[(1RS, 3RS; 1RS, 3SR)-3-(4'-bromobifenil-4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxycumarina) (N° CAS 28772-56-7 / N° CE 249-205-9): 0,0029%.
<i>PRESENTACIÓN:</i>	Estuche de cartón conteniendo 150 g de cebo fresco en bolsitas individuales de 10g.
<i>CARACTERÍSTICAS:</i>	Apariencia: Cebo fresco /pasta Color: Rosáceo-rojo
<i>APLICACIONES:</i>	Elimina ratas y ratones. Cómoda aplicación.
<i>MODO DE EMPLEO:</i>	Instrucciones de uso: Lea y siga la información del producto así como cualquier otra información que acompañe al producto o proporcionada en el punto de venta antes de usarlo. Antes de usar productos rodenticidas, se recomienda la utilización de métodos no químicos (ej: trampas). Retirar la comida fácilmente disponible para los roedores (ej: grano suelto o residuos de alimentos). Aparte de esto, no limpiar la zona a tratar justo antes del tratamiento, esto solo molestará a los roedores y la aceptación del cebo será más difícil de alcanzar. Los portacebos deben ser colocados en las inmediaciones de los lugares donde se han observado actividad de roedores (zonas de paso, sitios de anidación, cebaderos, agujeros, madrigueras, ...). Cuando sea posible, el portacebos debe estar fijados al suelo o a otras estructuras. No abrir las bolsitas que contienen el cebo. Colocar los portacebos fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas, animales de granja y otros animales a los que no va destinado el producto. No se debe aplicar en áreas donde los alimentos/piensos, bebidas, utensilios de cocina o las superficies de procesamiento de alimentos puedan entrar en contacto con el producto o bien ser contaminados por el mismo. No colocar los portacebos cerca de sistemas de drenaje de agua donde el cebo pueda entrar en contacto con el agua. Durante el uso del producto no comer, no beber o fumar. Lavar las manos y las áreas de piel expuestas después de utilizar el producto. Retirar el cebo sobrante y el portacebos al final del tratamiento.

*INSTRUCCIONES  
ESPECÍFICAS DE USO*

**Ratones y ratas en interior (público en general):** Ratones: 60 g de cebo por portacebo. Ratas: 100 g por portacebo. Los portacebos deben revisarse al menos cada 2-3 días al comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana, para comprobar la aceptación del cebo, que los portacebos están intactos y para retirar los roedores muertos. Recargar el portacebos cuando sea necesario. Se recomienda el uso de guantes.

**Ratas alrededor de edificaciones (público en general):** 100 g de cebo por portacebo. Colocar los portacebos en zonas no sujetas a inundación. Reemplazar los cebos que hayan sido dañados por el agua o contaminados por la suciedad. Los portacebos deben revisarse a los 5-7 días después del comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana, para comprobar la aceptación del cebo, que los portacebos están intactos y para retirar los roedores muertos. Recargar el portacebos cuando sea necesario. Se recomienda el uso de guantes.

**ZELNOVA ZELTIA, S.A.  
36400 - PORRIÑO (Pontevedra)**